HASCON M10 Alta Densità

ПРИШВИДШУЄ ДОЗРІВАННЯ ВРОЖАЮ ТА ПІДВИЩУЄ ВМІСТ ЦУКРІВ

«ХАСКОН М10 А-Д», завдяки ексклюзивній технології виробництва, має унікальне співвідношення між макроелементами N:P2O5:K2O=0:3:4. таке співвідношення зупиняє вегетативний ріст пагонів та спрямовує поживні речовини до плодів, що в свою чергу пришвидшує їх дозрівання, формуються високоякісні плоди з високим вмістом цукрів.

«ХАСКОН М10 А-Д» збагачений мікроелементами, такими як бор, марганець та молібден.

Застосування продукту на плодово-ягідних культурах після збору врожаю пришвидшує дозрівання деревини, що гарантує більшу стійкість до морозів.

Висока чистота сировини в поєднанні з інноваційними технологіями виробництва компанії Greenhas Group гарантує ідеальну змішуваність продукту **«ХАСКОН М10 А-Д»** навіть у воді з високим вмістом чистих карбонатів та бікарбонатів.

ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ «ХАСКОН М10 А-Д»?

1. Пришвидшує дозрівання врожаю
2. Підвищує вміст цукрів в плодах
3. Посилює стійкість рослин до несприятливих умов вегетації

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

КУЛЬТУРИ	ДОЗУВАННЯ		ФАЗИ РОЗВИТКУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
	ФЕРТИГАЦІЯ	ЛИСТОВЕ	
ЗЕРНОВІ КОЛОСОВІ			Фаза 2 - 3 листки - кущення (осінь)
КУКУРУДЗА			
СОНЯШНИК	-	1,5 - 2,5 л/га	
ОЗИМИЙ ТА ЯРИЙ РІПАК			Для стимуляції росту плодів, на початку дозрівання врожаю
ЗЕРНОБОБОВІ КУЛЬТУРИ			
ЦУКРОВИЙ БУРЯК			
ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ ВІДКРИТОГО ТА ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ	20 - 25 л/га	1,5 - 2,5 л/га	Для стимуляції росту плодів, на початку дозрівання плодів
ПЛОДОВО-ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ	20 - 25 л/га	2,0 - 4,0 л/га	Для стимуляції росту плодів, на початку дозрівання плодів та після збору врожаю для стимуляції дозрівання деревини

*Застосовувати продукт у концентрації 0,3 - 0,5%

ВМІСТ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ	
Оксид фосфору (P_2O_5), розчинний у воді	15% (210 г/л)
Оксид калію (K_2O), розчинний у воді	20% (280 г/л)
Бор (B), розчинний у воді	0,1% (1,4 г/л)
Марганець (Mn), хелатований EDTA, розчинний у воді	0,1% (1,4 г/л)
Молібден (Mo), розчинний у воді	0,01% (0,14 г/л)

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

Густина (при 20°C): 1,40 г/мл
pH (1% водного розчину): 7,0 ± 0,5 од. pH
Електропровідність (водний розчин 1 г/л): 550 мкСм/см